



Pesquisa da banana

A engenheira agrônoma Andrea Ribeiro Domingues, da Esalq, desenvolveu pesquisa sobre a produção da banana “nanição” em clima tropical de altitude.

Nacional – A9

Nanição

Pesquisa analisa produção de banana

Exploração econômica da bananeira em regiões com clima tropical de altitude tem mostrado o potencial de produção

Estudo desenvolvido pela engenheira agrônoma Andrea Ribeiro Domingues, aluna do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (USP/Esalq), buscou aperfeiçoar o entendimento sobre o desenvolvimento fisiológico da bananeira cv. “nanição” em clima tropical de altitude (Cwa), que tem como características estações bem definidas, Inverno frio e seco e Verão quente e chuvoso.

A bananeira, por ser uma planta típica de clima tropical, no clima Cwa é considerada marginal para seu cultivo em escala produtiva, devido à possibilidade de ocorrência de geadas, o que pode causar riscos à produção. “No entanto, ao longo dos anos, a exploração econômica dessa fruta em regiões com esse tipo de clima tem mostrado seu potencial. Isso se deve principalmente ao trabalho de pesquisadores e extensionistas que atuaram junto aos produtores para a melhoria da produção”, explica a autora do trabalho. As-

sim, seu projeto propôs estudar o desenvolvimento de um bananal comercial, observando as variações do ciclo de produção ao longo do ano, considerando duração, produção e rendimento.

Realizado na Fazenda Diamantina, em Tietê/SP, produtora de banana em uma área de 16 hectares, o projeto conduziu dois experimentos. O primeiro, realizado entre maio de 2010 e julho de 2011, verificou a formação do cacho da bananeira desde a emissão da inflorescência até a colheita nas diferentes épocas do ano, a fim de observar as durações do período, massas dos cachos e o reflexo na produção final. No segundo experimento estudaram-se os quatro primeiros ciclos de produção, que compreende o período desde a implantação do bananal, em setembro de 2005 até agosto de 2010, para verificar a duração, produção e rendimento médio de cada ciclo.

Com orientação do professor João Alexio Scarpore Filho, do Departamento de Produção Vegetal (LPV), o

trabalho concluiu que a produção de banana cv. ‘Nanição’ é marcada por oscilações na quantidade de inflorescências emitidas nas diferentes épocas do ano. “As maiores taxas de emissões ocorrem na época mais quente e chuvosa e taxas bem inferiores na época fria e seca do ano”, conta a pesquisadora.

O menor intervalo de duração entre a inflorescência e a colheita foi observado em bananeiras que emitem a inflorescência em condições de alta temperatura, enquanto que os maiores intervalos foram notados em plantas que emitem inflorescência nas épocas mais frias e secas do ano.

As massas dos cachos e a produção também apresentaram variações ao longo do ano. Ambos são encontrados em níveis superiores durante o período mais frio e seco do ano, acontecendo o inverso durante a época mais quente e chuvosa. “As variações das massas dos cachos estão relacionadas com as condições climáticas ocorridas no período entre a diferenciação floral e a emissão



Pesquisa buscou aperfeiçoar entendimento sobre o desenvolvimento da bananeira

da inflorescência dos cachos”, explica. Quanto à variação da produção nos quatro primeiros ciclos, Andrea acrescenta que o rendimento médio anual de cada ciclo varia, de

modo que, a partir do terceiro, o rendimento médio anual decresce e estabiliza-se devido à extensão da duração do ciclo de produção, causada pelas condições de baixas

temperaturas que as bananeiras estão sujeitas nesse tipo de clima. Em 2010, a fruta foi a mais produzida e consumida no mundo e o Brasil foi o quinto maior produtor.